## IVERTISSEMENTS

AGRICOLES

DLP 29-5-69 932822

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE : 1- miméros par mi

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

**ABONNEMENT ANNUEL** 

ET FRANCHE-COMTÉ : 21, Route de Seurre : 21 BEAUNE : Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-FT-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Regisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C.C.V. DIJON 3405.12 K.

Supplément nº 4 au Bulletin nº 104 - HAT 1969

28 MAI 1969

## VIGHE

MILDIOU: Comme prévu les taches cont apparues dès le « Vai de façon généralisée à partir des foyers découverts dès le « Nai et à la suite des pluies contaminatrices du 15 et 15 hai. L'évolution des conditions climatiques, le développement de la végétation imposent un traitement dès réception (de toute manière ovent le 51 Mai). Apporter le plus grand soin à l'ébourgeonnage. Assurer au maximum la protection des jeunes grappes par une pulvérisation soignée. OIDIUM: Ajouter un produit anti-oïdium à la bouillie.

CCCHYLIS - MUDEMIS - PYRAIM: Ajouter un insecticide à la bouillie.

## ARBELS FRUITI TS

TAVELURE DU POIRTER, TAVELURE OT OIDIUM DU POMET IR :Renouveler les traitements.

ANTHE ACTORN DE CARLOTTE : Effectuer une pulvérisation avec un fongicide organique comme Phaltame : 100 g. de Matière active/hl - Manèbe : 160 g. Oxyquinoléate de Cuivre : 50 g. cu
Doguadine : 90 g. qui sera par aillours seule utilisée à moins de 15 jours de la récolte.

CIDIUM MERICAIN DU CHO MILLER A MA UNEMAN : La maladie vient d'apparaître, les producteurs distroux de limiter les attacues de ce champignon dans les cultures de Cassissiers doivent effectuer un promier traitement. On utilisera soit le Dinocap à 25 g. de matière active à l'hesbolitre soit le Drazoxolon à 40 g. de M. A./ha.

## CULTURE LEGULIERES

POURLITURI GUSE SUR FRAISES: Les conditions atmosphériques sont très favorables au développement de la maladie. Renouveler les traitements en tonaut compte des délais d'emploi des produits envant récolte.

MIDIOU DI L'OICHON: Dans les secteurs sensibles à la maindie, il est conseillé d'effectuer un premier traitement, en atomisatione préférence avec un produit organique de synthèse.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés des Averticsements Agricoles

Imprimerie de la Station "cour gegne et Franche-Comté" - Le Directeur-Gérant :

L. BOUYA.

I-Ingénieur en Chef d'Agronomis -Importeur de la Protection des Vérétmux C'acouscription Phytosamitaire "Bourgogno et Pronche-Comté":

I. SOURED.